



جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی ایران

همزمان با جهانی سال بین‌المللی تغذیه و اکسنسن اسپریون گذشته
ظاهراً نایاب ارتقای سلامت کودکان
و درمان واکسن روتا ویروس به نفع
لبعن سازی کودکان



روتای روتا سپار واکسن روتا ایمن تر و سالم تر



راهنمای استفاده از واکسن روتا ویروس - ویژه کارکنان نظام سلامت



یونیسف
برای همه کودکان





راهنمای استفاده از واکسن روتاواروس ساخت سرم انسیتیو هند (SII) (روتاسیل)

این راهنمای ترجمه و تخلیص از اطلاعات منتشره از واکسن روتاواروس ۵ ظرفیتی تولیدی موسسه سرم انسیتیو هند (SII) با نام تجاری روتاسیل (ROTASIIL) است.

نام محصول: واکسن روتاواروس ۵ ظرفیتی (روتاسیل)
ترکیبات:

واکسن روتاواروس، ویروس زنده ضعیف شده (خوارکی) و پنج ظرفیتی است. این واکسن شامل پنج ویروس (سویه های انسانی و گاوی) از سرotyp های G1, G2, G3, G4 و G9 بوده و برای محافظت در برابر هر گونه عقونت شدید روتاواروس مورد استفاده قرار می گیرد. واکسن روتاسیل الزامات سازمان جهانی بهداشت WHO را رعایت نموده و همچنین مورد تأیید سازمان غذا و داروی ایران می باشد.

واکسن در ۳ فرمول مختلف وجود دارد. همهی انواع این واکسن برای مصرف خوارکی است و برای تزریق نمی باشد:
مایع (Liquid)، لیوکیلیزه (Lyophilized) و لیوکیلیزه باثبات حرارتی (-thermostable lyophilized)

واکسنی که در گشوار مورد استفاده قرار می گیرد روتاسیل تمام مایع دودوزی است، مشخصات واکسن به شرح زیر می باشد:


روتاسیل مایع (ROTASIIL-Liquid)
به صورت مایع در ویال آماده برای استفاده با حجم ۴ میلی لیتر در دسترس است.

- واکسن دارای مشخصات زیر می باشد:
- به شکل مایع و دودوزی می باشد
- هر دوز حاوی ۲ میلی لیتر است.
- باید در درجهای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد، در طبقه میانی یخچال و دور از نور نگه داری شود
- واکسن نباید بخ برند.
- سرنگ ها و آداب پرورهای روتاسیل مایع دودوزی باید در جای خشک و خزک نگه داری شوند.



- تاریخ انقضای بروزی ویال، بر جسب اصالت و کارتین درج گردیده است. واکسن های دودوزی پس از بازشدن ویال در درجهای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد به مدت ۶ ساعت قابل نگه داری است و باید در یخچال، کلد باکس و واکسن کریر نگه داری و حمل شود. اگر واکسن آماده سازی شده بعد از ۶ ساعت استفاده نشد باید با رعایت ضوابط و دستورالعمل های مربوطه دور ریخته شود.
- واکسن دارای ۷VVM7 و ماندگاری ۲۴ ماه است.

در ۷VVM7 غیرقابل استفاده، رنگ مریع داخلی همنزگ دایره (پیروزی) یا تیره تراز آن است.



• محتویات داخل سرنگ را به شکل خوارکی و با احتیاط برای کودک تجویز کنید، شیرخوار را در حالت نیمه دراز کش در آغوش مادر قرار دهید، با فشار ملایم گونه های هم، دهان نوزاد را باز کنید، سرنگ را در زاویه ۴۵ درجه قرار دهید، به آرامی پیستون سرنگ را فشار دهید سپس متوقف کنید تا شیرخوار بتواند قورت دهد، کل محتویات را در قسمت داخلی گونه شیرخوار به طریق توضیح داده شده بریزید، کودک نباید در حالت دراز کش باشد (به علت خطر آسیب رسانیون: ورود محتویات به ره ها)




آدأپتور را از روی ویال واکسن جدا نکنید و برای دوز دوم واکسن سرنگ جدیدی باز کنید.
نکته مهم: واکسن تا ۶ ساعت در درجه ۲ تا ۸ درجه در یخچال یا کلد باکس قابل نگه داری است.
نکته: اگر شیرخوار هنگام یا بعد از دریافت واکسن روتا ویروس استفراغ کرد، نیاز به تکرار واکسن نیست.

نکات مهم در خصوص تعداد، فواصل، سنین تجویز واکسن


- این واکسن درسه نوبت و در سنین ۳، ۴ و ۶ ماهی تجویز می شود (ابتداید واکسن های خوارکی و سپس واکسن های تزریقی تجویز گردد)
- حداقل ترسن دریافت واکسن روتا ویروس برای نوبت اول کمتر از ۱۵ هفته (۱۴ هفته و ۷ روز) و برای نوبت های دوم و سوم کمتر از ۸ ماه (۷ ماه و ۳۹ روز) است.
- واکسن روتا ویروس رامی توان هم زمان یا با هر فاصله ای از سایر واکسن ها تجویز نمود.
- در شرایط خاص می توان فواصل بین نوبت های واکسن روتا ویروس را به یک ماه کاهش داد.

راهنمای استفاده از واکسن


• در پوش های پلاستیکی را از روی ویال واکسن بردارید.




• آدأپتور را از روی ویال قرار دهید و سپس سرنگ را به آدأپتور ویال وصل کنید.



• در حالی که از اتصال سرنگ به ویال اطمینان دارید سرنگ را در حال اتصال وارونه نموده و ۲ میلی لیتر را به داخل سرنگ بکشید.



• آدأپتور را از سرنگ جدا کنید تا برای خواردن واکسن آماده شود.



اطلاعات ایمن‌سازی بعد از ادغام واکسن روتاویروس چگونه ثبت خواهد شد؟

همه مستندات مورد نیاز برای سایر واکسن‌های برنامه جاری ایمن‌سازی برای واکسن روتاویروس هم باید تهیه و تکه‌داری شوند و ثبت مشخصات واکسن در کارت مراقبت کودک و سامانه‌های الکترونیک سطح اول نیز مانند سایر واکسن‌ها انجام می‌گردد.

نکته در خصوص ثبت واکسن در سامانه‌های سطح یک:
در گزینه‌های انتخابی واکسن روتاویروس دقت گردد و واکسن روتاسیل انتخاب شود.

درباره انتیتوسرم هند

انتیتوسرم هند (Serum Institute of India) با تولید و فروش بیش از یک و نیم میلیارد دوز واکسن، به عنوان بزرگترین تولیدکننده واکسن در جهان شناخته می‌شود. این موسسه، در زمینه تولید واکسن‌های مختلف، از جمله نوموسیل (علیه پنوموکوک) و روتاسیل (علیه روتاویروس) سابقه درخشانی دارد. انتیتوسرم هند، همچنین واکسن‌های دیگری مانند فلج اطفال، دیفتری، کزان، سیاه سرفه، هموفیلوس آنفلوانزا، BCG، هپاتیت B، سرخک، اوریون، سرخرجه و کووید-۱۹ را تولید می‌کند. تخمین زده می‌شود که حدود ۶۵ درصد از کودکان در سراسر جهان، حداقل یک دوز از واکسن‌های تولیدی انتیتوسرم هند را دریافت گردیده‌اند. واکسن‌های تولید شده این موسسه، توسط سازمان جهانی بهداشت در رتوتاویروس را تایید شده‌اند و در حدود ۷۵٪ کشور جهان، در برنامه‌های ملی ایمن‌سازی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تهیه شده توسط

معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشگی
مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر
اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن

عوارض جانبی

این فرآورده مانند سایر مواد دارویی به مواد اثر مطلوب خود ممکن است باعث بروز برجسته عوارض ناخواسته نیز شود. اگرچه تمام این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شوند، عوارض موضعی و سیستمیک احتمالی پس از تجویز خواهی این واکسن تب، بی‌قراری و باحتمال کمتر، کاهش اشتها، بی‌حالی، تهوع، اسهال می‌باشد. هرچند در مطالعات انجام شده تاکنون، شدت این عوارض در حد خفیفتا متوسط بوده و عارضه شدیدی‌ایجادی تاکنون گزارش نشده است.

موارد منع مصرف

حساسیت به هریک از اجزای واکسن از موارد منع مصرف واکسن می‌باشد. در کودکانی که با دریافت دوز قبلی واکسن علائم حساسیت شدید مانند آنافیلاکسی داشته اند نباید دوزهای بعدی همان واکسن را دریافت کنند.

شیرخواران با سابقه ناهنجاری‌های روده‌ای بد و تولد درمان نشده، نباید واکسن دریافت کنند.

سابقه پیچ خورده‌گی روده یا انواریناسیون (intussusception) از موارد منع مصرف واکسن است.

افراد مبتلا به یه‌ماری تقصی ایمنی ترکیبی شدید Severe Combined Immunodeficiency Disease (SCID) نباید واکسن دریافت کنند.

کودکان با سایر بیماری‌های نقص سیستم ایمنی بعد از مشاوره و دریافت نظر پزشک معالج می‌توانند واکسن روتاویروس را دریافت کنند.

باتوجه به ماهیت واکسن روتاویروس که ویروس زنده ضعیف شده می‌باشد، ذکر نکات زیر حائز اهمیت است

شیرخواران در تماس با خانم باردار می‌توانند واکسن را دریافت کنند.

شیرخواران در تماس با فرد مبتلا به نقص سیستم ایمنی می‌توانند واکسن روتاویروس را دریافت کنند، توصیه می‌شود افراد مبتلا به نقص شدید سیستم ایمنی تا ۴۰ هفته پس از واکسیناسیون شیرخوار از تماس با یوشک یا کهنه شیرخوار خودداری کنند.

در صورت بستره شیرخواری که اخیراً واکسن روتاویروس را دریافت نموده است رعایت نکات حفاظتی و بهداشتی ضروری است.



بیونیسف
برای همه گویان

